

	Nom du document : Liste de contrôle équipes de vaccination à domicile AVASAD		
	Version #: 2.1		
	Validé par : GENTON Blaise HALFON Patricia BESSON Juliette	MIAUTON Alix STRUB Blandine	

Liste de contrôle équipes de vaccination à domicile AVASAD

(le jour de la vaccination)

- **Vérifier l'identité de la personne à vacciner**
(Nom, prénom, année de naissance)
- **Vérifier les éventuelles précautions/contre-indications** (allergies, prise d'un traitement anticoagulant) **contenues dans le dossier patient**
- **Avant de procéder à la vaccination, poser les questions suivantes :**
 - **Êtes-vous connu.e pour une allergie ?** Si oui, se référer à la fiche Vaccination contre le SARS-CoV-2 en cas d'antécédent allergique.
 - **Prenez-vous un traitement anticoagulant ?** (par exemple Sintrom[®], Xarelto[®], Marcoumar[®], Eliquis[®], Pradaxa[®], Lixiana[®] ou autres - Les traitements antiagrégants tels Aspirine[®], Plavix[®] et Brilique[®] ne sont pas des anticoagulants).
Si oui, comprimer 2 minutes après l'injection intramusculaire (pas d'injection sous-cutanée !)
 - Avez-vous **actuellement un état grippal** (fièvre dans les dernières 48h ou symptômes évocateurs du COVID-19) ?
⇒ Si oui, un avis auprès d'un médecin référent est nécessaire.
 - **Avez-vous déjà eu le COVID-19 ?**
Si oui, une seule dose suffisante (sauf si immunosuppression, où 2 doses restent nécessaires)
Vaccination minimum 3 mois après la maladie (6 mois si personne en bonne santé habituelle).
 - **Est-ce la 2ème dose de vaccin ?**
Vérifier que le vaccin soit le même qu'à la 1ère dose. Un délai minimum de 28 jours avant la deuxième dose est requis. Un délai plus long n'est pas problématique.
- **Procéder à la vaccination en injection intramusculaire** (ne pas purger la bulle d'air dans la seringue ! Ne pas taper sur la seringue !)
- **Entrer le patient dans VacoViD via son numéro d'assuré. Enregistrer le numéro de lot et valider la vaccination.**
- **Remplir le carnet de vaccination si disponible**
- **Surveiller la personne vaccinée**
Pas d'antécédent d'allergie : surveillance pendant 15 minutes après la 1^{ère} dose, 5 minutes après la 2^{ème} dose
Antécédents d'allergie (selon guideline allergie) : 30 minutes après chaque dose