
	Nom du document : Liste de contrôle pharmacies		
	Version #: 1.1		
	Validé par : GENTON Blaise MAUTON Alix GROUZMANN Marie-Christine HENCHOZ-DUMONT Sarah BESSON Juliette	Date de validation : 27.05.2021	

Liste de contrôle avant vaccination en pharmacie

- **Vérifier l'identité de la personne à vacciner**
(Nom, prénom, année de naissance)
- **Avant de procéder à la vaccination, poser les questions suivantes :**
 - **Avez-vous eu de la fièvre ces dernières 48h ?** Si oui, reporter la vaccination. Evaluer l'indication à un test COVID-19.
 - **Êtes-vous connu pour une allergie ?** Si oui, se référer à la fiche « Vaccination contre le SARS-CoV-2 en cas d'antécédent allergique »
 - **Pourriez-vous être enceinte ?**
Si oui, pas de vaccination hormis si la balance risque-bénéfice a été discutée en amont entre le médecin et la patiente et que celle-ci souhaite malgré tout se faire vacciner dès le 2^{ème} trimestre.
 - **Êtes-vous né après 2005 ?**
Si oui, pas de vaccination hormis si la balance risque-bénéfice a été discutée en amont avec le pédiatre (cas particuliers liés par exemple à une maladie chronique sévère).
 - **Êtes-vous né entre 2004 et 2005 (après 2003) ?**
Si oui, vaccination avec le vaccin Pfizer uniquement.
 - **Prenez-vous un traitement anticoagulant ?** (par exemple Sintrom®, Xarelto®, Marcoumar®, Eliquis®, Pradaxa®, Lixiana® ou autres)
Si oui, comprimer 2 minutes après l'injection intramusculaire (pas d'injection sous-cutanée !)
 - **Est-ce la 2^{ème} dose de vaccin ?**
Vérifier que le vaccin soit le même qu'à la 1^{ère} dose. Un délai minimum de 28 jours avant la deuxième dose est requis. Un dépassement de ce délai n'est pas problématique.
- **Procéder à la vaccination en injection intramusculaire**
- **Entrer le patient dans VacoViD via son numéro d'assuré. Enregistrer le numéro de lot et valider la vaccination.**
- **Remplir le carnet de vaccination si disponible**
- **Surveiller obligatoirement la personne vaccinée**
Pas d'antécédent d'allergie : surveillance pendant 15 minutes après la 1^{ère} dose, 5 minutes après la 2^{ème} dose
Antécédents d'allergie (selon guideline allergie) : 30 minutes après chaque dose